

بررسی نگرش فرآیند پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

امید محمد امینی^{*}، شهرزاد غیاثوندی، یعقوب حمه خضری

چکیده

امید محمد امینی*

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران، ایران (نویسنده مسئول)

شهرزاد غیاثوندی

دانشیار گروه پرستاری داخلی
جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

یعقوب حمه خضری

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران، ایران

دریافت: ۹۵/۱۲/۲

پذیرش: ۹۶/۵/۳۰

مقدمه و هدف: فرآیند پرستاری به عنوان یک استاندارد مراقبتی باعث بهبود کیفیت مراقبت و افزایش رضایتمندی پرستاران از حرفه خود می‌شود. مسائل حرفه‌ای از جمله باور و نگرش در اجرای فرآیند پرستاری تأثیرگذارند؛ لذا این مطالعه باهدف تعیین نگرش پرستاران شاغل نسبت به فرآیند پرستاری انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی ۱۶۷ پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه نگرش فرآیند پرستاری بومان (۱۹۸۳) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار کل نمره نگرش $62/39 \pm 10/07$ بود. بین امتیاز نگرش با جنسیت، وضعیت تأهل، انتخاب رشته پرستاری، میزان تحصیلات و سمت کاری اختلاف آماری معناداری وجود نداشت ($p > 0.05$)؛ اما بین امتیاز نگرش با سن ($p < 0.02$)، سابقه کار ($p < 0.01$)، آشنازی با فرآیند پرستاری ($p < 0.001$)، علاقه‌مندی به رشته پرستاری ($p < 0.001$) و اجرای فرآیند پرستاری در امر مراقبت ($p < 0.001$) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده اکثر پرستاران نگرش مثبتی نسبت به فرآیند پرستاری دارند و بیشتر آن‌ها فرآیند پرستاری را در امر مراقبت بکار می‌گیرند. همچنین پرستاران باسابقه کار و رضایت شغلی بالاتر، آگاه‌تر با فرآیند پرستاری و نیز پرستارانی که فرآیند پرستاری را بکار می‌گیرند نگرش مثبت‌تری دارند. لذا توصیه می‌شود جهت توسعه و تبدیل تئوری به عمل، در محیط بیمارستان از روش‌های آموزشی فعال و دوره‌های بازآموزی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: نگرش، فرآیند پرستاری، پرستار

مقدمه

می شود (۹). در مطالعه‌ای که بر روی تعدادی از پرستاران شهر تهران انجام شد تنها ۱۳ درصد از پرستاران فرآیند پرستاری را آن‌هم به‌طور ناقص در مراقبت‌های پرستاری خود به کار می‌بردند (۷). همچنین مامسری^۱ (۲۰۱۲) نشان دادند که ۸۱٪ پرستاران فرآیند پرستاری را آموزش می‌یابند ولی ۴۳٪ از آن‌ها قادر به اجرای آن هستند (۱۰). پرستارانی که دانش و نگرش مثبتی نسبت به فرآیند پرستاری دارند تمایل بیشتری به اجرای آن دارند (۱۱). عوامل تأثیرگذار بر اجرای فرآیند پرستاری متنوع و پیچیده‌اند (۱۲). آتش شوریده و اشک تراب در تحقیقی کیفی (۱۳۹۰) با عنوان عوامل مؤثر بر اجرای فرآیند پرستاری توسط پرستاران به این نتیجه رسیدند که آگاهی، مهارت و نگرش نسبت به فرآیند پرستاری در اجرای آن تأثیر دارند (۱۳).

فرآیند پرستاری ابزاری برای عملکرد پرستاران معرفی شده با این حال طبق مطالعات فوق میزان به کارگیری فرآیند پرستاری در کشور ما بسیار پایین می‌باشد. و با توجه به اینکه یکی از موانع اجرای فرآیند پرستاری نگرش پایین پرستاران نسبت به فرآیند پرستاری است (۱۳) و هیچ پژوهشی جهت تعیین نگرش پرستاران نسبت به فرآیند پرستاری در ایران صورت نگرفته است این مطالعه با هدف تعیین نگرش فرآیند پرستاری در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۳ انجام شد.

مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفی مقطوعی است که بر روی ۱۶۷ پرستار شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. معیار ورود به مطالعه شامل تمامی پرستاران شاغل در

یکی از مهم‌ترین راه‌ها جهت بهبود کیفیت مراقبت‌های پرستاری استفاده از استاندارد فرآیند پرستاری در امر مراقبت است (۱). در دایره المعارف و فرهنگ لغت پژوهشی میلر، فرآیند پرستاری مجموعه‌ای هدفمند از فعالیت‌های پرستاری در یک روش سیستماتیک و منظم تعریف شده است (۲). مراحل فرآیند پرستاری به صورت‌های گوناگون توسط نویسنده‌های مختلف نوشته شده است، اما اجزای رایج آن شامل بررسی، تشخیص، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی است (۳). فرآیند پرستاری یک رویکرد تصمیم‌گیری سیستماتیک به حل مسئله است (۴)؛ که با تأکید بر عملکرد مستقل پرستاران و انجام اقدامات سنجیده باعث افزایش کیفیت مراقبت می‌شود (۵). فرآیند پرستاری دارای مزایای بسیاری از جمله باعث افزایش بازده فعالیت‌های پرستاری (۴)، گسترش مراقبت‌های بهداشتی از جمله آموزش بهداشت و پیشگیری؛ کاهش هزینه‌های درمان و کنترل بیشتر بیماران بر بیماری مزمن می‌شود (۶) و عدم اجرای آن در بیمارستان‌ها باعث مشکلات فراوانی از جمله کاهش رضایت شغلی، تنزل پرستاری از نظر علمی و عملی، کاهش کیفیت مراقبت، کم توجهی برخی از مسؤولین به این رشتہ، اطاعت کورکورانه، انجام مراقبت‌های تک بعدی، کاهش استقلال بیماران و در نهایت صرف هزینه‌های فراوان به علت انجام اعمال تکراری می‌شود (۷).

فرآیند پرستاری در اکثر سیستم‌های بهداشتی- درمانی دنیا در حال اجراست (۸)؛ علی‌رغم اینکه مزایا و فواید اجرای آن معلوم شده است و آموزش آن در دروس پرستاری گنجانده شده است متأسفانه از این روش سیستماتیک در کشور ما به‌طور مناسب استفاده نمی‌شود یا حداقل به میزان بسیار محدودی استفاده

1. Mamseri

گرفت و از آن‌ها در مورد روانی و قابل درک‌بودن گویه‌ها سؤال شد و تغییرات لازم داده شد. جهت سنجش پایایی ابزار پرسشنامه در اختیار ۳۰ دانشجوی پرستاری قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که معادل ۰/۸۶ بود.

به پرستاران در مورد هدف پژوهش، اختیاری بودن شرکت در پژوهش و حفظ اسرار و اطلاعات اخذشده و عدم نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی در پرسشنامه توضیح داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS v.22 انجام یافت. برای محاسبه پارامترهای توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و برای محاسبه پارامترهای تحلیلی از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد.

یافته‌ها

میانگین سن و سابقه کار شرکت‌کننده‌ها در این تحقیق به ترتیب $۴۱\pm ۸/۱۷$ و $۴۲\pm ۷/۴۷$ و $۴۲\pm ۷/۴۷$ بود. ۹۱ نفر از شرکت‌کنندگان زن و ۷۶ نفر (۵۴/۵) نفر از شرکت‌کنندگان همچنین (۱۱۳/۰.۶۷٪) نفر از آن‌ها متاهل بودند. ۴۹٪ از شرکت‌کنندگان آشنایی زیادی با فرآیند پرستاری داشتند و ۶۲٪ از آن‌ها فرآیند پرستاری را در امر مراقبت بکار می‌بردند (جدول ۱).

میانگین و انحراف معیار کل نمره نگرش به شدت موافق و موافق بودند که فرآیند پرستاری، مراقبت‌های پرستاری را بهبود می‌بخشد. ۸۲٪ از پرستاران به شدت موافق و موافق بودند که زمان کافی برای اجرای فرآیند پرستاری وجود ندارد. ۷۴٪ از شرکت‌کنندگان موافق و به شدت موافق بودند که اولویت‌های مراقبتی با استفاده از فرآیند پرستاری به آسانی شناسایی می‌شود. ۷۸٪ از شرکت‌کنندگان به شدت موافق و موافق بودند که فرآیند پرستاری

بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشند و معیار خروج از مطالعه شامل عدم تعایل پرستاران به شرکت در مطالعه بود. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه نگرش فرآیند پرستاری بود که توسط بومان در سال ۱۹۸۳ طراحی شده است و شامل ۲۰ سؤال، ۱۰ سؤال مثبت و ۱۰ سؤال منفی است. امتیاز هر سؤال بین ۱ تا ۵ است؛ که امتیاز ۵ یانگر نگرش خیلی مثبت نسبت به فرآیند پرستاری و امتیاز ۱ یانگر نگرش خیلی منفی نسبت به آن است. درمجموع امتیاز این ابزار بین ۲۰ تا ۱۰۰ خواهد بود (۱۴).

جهت سنجش روایی و پایایی این ابزار با روش ترجمه باز ترجمه و تطبیق فرنگی و سازمانی، نسخه فارسی پرسشنامه تهیه گردید. از آنجاکه تا به حال از این ابزار در ایران استفاده نشده بود، ابتدا یک مترجم اولیه را انجام داد و سپس مترجم دوم آن را با اصل اनطباق داد و در نهایت ترجمه نهایی به شکل توافقی پذیرفته شد. سپس ترجمه معکوس انجام شد. بدین صورت که یک مترجم دوزبانه که تسلط کافی بر زبان انگلیسی داشت، متن ترجمه فارسی ابزار را به انگلیسی برگرداند درحالی که هیچ آگاهی از متن انگلیسی آن نداشت، آنگاه تطابق ترجمه با اصل متن صورت گرفت تا در نهایت تطابق مطلوب در تمامی موارد حاصل شد و در مرحله بعدی نسخه فارسی توسط پژوهشگر مطالعه گردید و مواردی که نیاز به تغییر داشت بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید. جهت روایی محتوا ابزار در اختیار ۱۰ نفر از اساتید دانشکده پرستاری مامایی تهران قرار گرفت. در ضرورت وجود آیتم، تمامی اساتید گویه‌ها را ضروری و قابل درک شناسایی کردند؛ و جهت بررسی روایی صوری ابزار در اختیار ۱۰ دانشجوی پرستاری قرار

انتخاب رشته پرستاری، میزان تحصیلات و سمت کاری نشان نداد ($p > 0.05$)؛ اما بین امتیاز نگرش با سن ($p < 0.02$)، سابقه کار ($p < 0.01$)، آشنایی با فرآیند پرستاری ($p < 0.001$)، علاقه‌مندی به رشته پرستاری ($p < 0.001$) و اجرای فرآیند پرستاری در امر مراقبت ($p < 0.001$) اختلاف آماری معناداری وجود داشت

آگاهی از نیازهای بیمار را بهبود می‌بخشد. ۶۷/۷٪ از پرستاران بهشدت موافق و موافق به کارگیری فرآیند پرستاری بودند. ۷۴/۹٪ از شرکت‌کنندگان موافق و بهشدت موافق بودند که فرآیند پرستاری کارآیی دارد. (جدول ۲).

آزمون‌های آماری ارتباط معناداری بین نمره نگرش فرآیند پرستاری با جنسیت، وضعیت تأهل،

جدول ۱: اطلاعات دموگرافیک

| | | میانگین نگرش (SD) | N (%) | |
|---------|--------------|-------------------|------------|---|
| 0.878 | 62.26 (11.2) | 91 (54.5) | زن | جنس |
| | 62.5 (9.04) | 76 (45.5) | مرد | |
| 0.764 | 62.05 (8.7) | 54 (32.3) | مجرد | تأهل |
| | 62.55 (10.9) | 113 (67.7) | متاهل | |
| 0.027 | 66.5 (6.4) | 4 (2.4) | <24 | سن |
| | 60.3 (9.8) | 53 (31.7) | 24-30 | |
| | 61.44 (9.1) | 50 (29.9) | 30- 36 | |
| | 61.1 (11.05) | 20 (12) | 36-42 | |
| | 65.14 (10.8) | 27 (16.2) | 42-48 | |
| | 69.61 (8.9) | 13 (7.8) | >48 | |
| | 61.5 (9.4) | 36 (21.6) | <5 | |
| | 61.06 (9.3) | 61 (36.5) | 5_10 | |
| 0.012 | 59.07 (10.5) | 26 (15.6) | 10_15 | سابقه کار |
| | 65.44 (11.2) | 18 (10.8) | 15-20 | |
| | 66.61 (9.09) | 13 (7.8) | 20-25 | |
| | 69.3 (9.4) | 13 (7.8) | >25 | |
| | 61.62 (9.7) | 132 (79) | پرستار | |
| | 66.03 (11.3) | 26 (15.6) | مسئول شیفت | |
| 0.095 | 61.37 (9.7) | 8 (4.8) | سرپرستار | سمت کاری |
| | 77 (-) | 1 (0.6) | سوپریویزر | |
| | 62.9 (9.5) | 140 (83.8) | لیسانس | |
| 0.232 | 59.42 (12.5) | 26 (15.6) | فوق‌لیسانس | مدرک تحصیلی |
| | 68 (-) | 1 (0.6) | دکترا | |
| | 65.28 (9.7) | 87 (52.1) | بله | |
| P<0.001 | 59.25 (9.4) | 80 (47.9) | خیر | آیا پرستاری انتخاب اول شما بود؟ |
| P<0.001 | 67.24 (8.6) | 83 (49.7) | زياد | آیا بعد از ورود به رشته پرستاری به آن علاقه‌مند شدید؟ |
| | 59.50 (8.1) | 69 (41.3) | متوسط | |
| | 48.86 (8.1) | 15 (9) | کم | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----|--|
| P<0.001 | 65.76 (8.3) | 105 (62.9) | بله | آیا در امر مراقبت از فرآیند پرستاری استفاده می کنید؟ |
| | 56.69 (10.1) | 62 (37.1) | خیر | |
| p<0.05 معنادار است. | | | | |

جدول ۲: نگرش پرستاران از فرآیند پرستاری

| گویه ها | خیلی موافق | موافق | نمایانم | مخالفم | به شدت مخالفم |
|---|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| ۱. فرآیند پرستاری مراقبت های پرستاری را بهبود می بخشند. | 25 (15) | 103 (61.7) | 22 (13.2) | 17 (10.2) | 0 (0) |
| ۲. فرآیند پرستاری کاغذ بازی بیش از حد است. | 27 (16.2) | 66 (39.5) | 25 (15) | 45 (26.9) | 4 (2.4) |
| ۳. فرآیند پرستاری بیش از حد وقت گیر است. | 22 (13.2) | 91 (54.5) | 18 (10.8) | 34 (20.4) | 2 (1.2) |
| ۴. فرآیند پرستاری آگاهی از نیازهای بیمار را بهبود می بخشند. | 20 (12) | 111 (66.5) | 25 (15) | 9 (5.4) | 2 (1.2) |
| ۵. فرآیند پرستاری، اتفاف وقت است. | 9 (5.4) | 40 (24) | 36 (21.6) | 76 (45.5) | 6 (3.6) |
| ۶. از فرآیند پرستاری در هر جا می توان استفاده کرد. | 5 (3) | 64 (38.3) | 47 (28.1) | 50 (29.9) | 1 (0.6) |
| ۷. فرآیند پرستاری یک سیستم کارتکسی دقیق تنظیم شده است. | 3 (1.8) | 44 (26.3) | 33 (19.8) | 81 (48.5) | 6 (3.6) |
| ۸. زمان کافی برای استفاده از فرآیند پرستاری وجود ندارد. | 46 (27.5) | 92 (55.1) | 16 (9.6) | 8 (4.8) | 5 (3) |
| ۹. اولویت های مراقبتی با استفاده از فرآیند پرستاری به آسانی شناسایی می شوند | 18 (10.8) | 106 (63.5) | 15 (9) | 25 (15) | 3 (1.8) |
| ۱۰. فرآیند پرستاری را می توان در عمل به خوبی بکار برد. | 10 (6) | 83 (49.7) | 27 (16.2) | 43 (25.7) | 4 (2.4) |
| ۱۱. پرستاران هرگز فرآیند پرستاری را نمی پذیرند. | 8 (4.8) | 50 (29.9) | 42 (25.1) | 61 (36.5) | 6 (3.6) |
| ۱۲. من تمایل دارم فرآیند پرستاری را بکار بگیرم. | 8 (4.8) | 100 (59.9) | 21 (12.6) | 34 (20.4) | 4 (2.4) |
| ۱۳. سیستم کاردکسی در فرایند ثبت پرستاری رضایت بخش نیست. | 4 (2.4) | 51 (30.5) | 38 (22.8) | 67 (40.1) | 7 (4.2) |
| ۱۴. از ایده فرآیند پرستاری خوش می آید. | 9 (5.4) | 91 (54.5) | 26 (15.6) | 38 (22.8) | 3 (1.8) |
| ۱۵. اکون برای به کار گیری فرآیند پرستاری آمادگی دارم. | 7 (4.2) | 75 (44.9) | 33 (19.8) | 45 (26.9) | 7 (4.2) |
| ۱۶. فرآیند پرستاری باید فقط توسط پرستاران واجد شرایط استفاده شود. | 13 (7.8) | 53 (31.7) | 30 (18) | 58 (34.7) | 13 (7.8) |
| ۱۷. از شنیدن در مورد فرآیند پرستاری کسل می شوم. | 11 (6.6) | 54 (32.3) | 24 (14.4) | 75 (44.9) | 3 (1.8) |
| ۱۸. بیماران فرآیند پرستاری را دوست ندارند. | 4 (2.4) | 31 (18.6) | 71 (42.5) | 55 (32.9) | 6 (3.6) |

| | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| ۱۹. من قبول دارم که فرآیند پرستاری کار آبی دارد. | 2 (1.2) | 24 (14.4) | 16 (9.6) | 114 (68.3) | 11 (6.6) |
| ۲۰. شروع استفاده از فرآیند پرستاری باعث مشکلاتی می‌شود. | 1 (0.6) | 29 (17.4) | 29 (17.4) | 95 (56.9) | 13 (7.8) |

کارشناس پرستاری و مقاطعه بالاتر تشکیل می‌دهند که فرآیند پرستاری را به طور اصولی آموزش می‌یابند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد پرستارانی که آشنایی زیادی (۴۹/۷٪) با فرآیند پرستاری دارند و آن را در امر مراقبت بکار (۶۲/۹٪) می‌گیرند نگرش مثبت تری نسبت به فرآیند پرستاری دارند؛ که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. این نتایج با مطالعه آبب^۵ و همکاران که باهدف بررسی سطح اجرای فرآیند پرستاری و فاکتورهای تأثیرگذار بر آن انجام شد، به طوری که دانش فرآیند پرستاری را در ۱۱/۵۸٪ از نمونه‌ها زیاد، ۶/۳۰٪ متوسط و ۳/۱۱٪ کم به دست آورد مشابه است (۱۱). اما با مطالعه جانسون که نشان داد ۸/۹٪ شرکت کنندگان فرآیند پرستاری را در امر مراقبت استفاده می‌کنند مغایر است (۱۷). این اختلافات زیاد در اجرای فرآیند پرستاری در مطالعات مذکور می‌تواند به دلایلی از جمله در اختیار داشتن فرم‌های ثبت فرآیند پرستاری، ثبت الکترونیکی فرآیند پرستاری و برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای بازآموزی فرآیند پرستاری باشد که در این مطالعات ذکر شده‌اند. همچنین این نتایج با مطالعه اکبری خاجی (۱۳۹۰) که نشان داد تنها ۱۳٪ از شرکت کنندگان فرآیند پرستاری را اجرا می‌کنند مغایر است (۷). این اختلاف می‌تواند به دلیل تفاوت در محیط بیمارستان‌ها باشد؛ به طوری که در مطالعه اکبری خاجی بیمارستان، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است؛ اما محیط مطالعه حاضر را بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهند

بحث و نتیجه‌گیری

این مطالعه باهدف تعیین نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین امتیاز نگرش فرآیند پرستاری برابر با ۳۹/۶۲ است؛ که نشان از نگرش مثبت آن‌ها نسبت به فرآیند پرستاری دارد، که با نتایج مطالعه بومان^۲ که نشان داد میانگین نمره نگرش (۱۵/۶۳) در گروهی از پرستاران که فرآیند پرستاری را تنها از طریق مطالعه متون و آموزش توسط مسئولین شیفت دریافت می‌کردند و ملزم به اجرای آن می‌شدند مشابه است (۱۴). همچنین با مطالعه هیلدمن^۳ که نشان داد پرستاران نگرش مثبتی نسبت به فرآیند پرستاری دارند هم راستا است (۱۵)؛ اما با مطالعه هاگوس که میانگین امتیاز نگرش فرآیند پرستاری را ۸۱/۷۱٪ به دست آورد مغایر است (۱۶). این اختلاف زیاد می‌تواند به دلیل تفاوت در جامعه پژوهش این دو مطالعه باشد به طوری که در مطالعه هاگوس^۴ بیشتر نمونه‌ها را (۵/۶۵٪) دیپلمه‌های پرستاری تشکیل می‌داد که فرآیند پرستاری را به صورت اصولی آموزش ندیده بودند و دانش کمی در مورد آن داشتند، به طوری که ۵/۳۷٪ از آن‌ها حتی قادر به ذکر تمام مرافق فرآیند پرستاری نبودند لذا احتمال می‌رود شرکت کنندگان مطالعه مذکور بدون آگاهی از فرآیند پرستاری اقدام به پر کردن پرسشنامه نگرش کرده باشند؛ این در حالی است که همه نمونه‌های مطالعه ما را فارغ‌التحصیلان

2. Bowman

3. Hildman

4. Hagos

نگرش از موانع اصلی اجرای اصولی فرآیند پرستاری است اما در مطالعه حاضر مشخص شد که در چند سال اخیر ظاهراً سیاست دانشکده‌های پرستاری و دانشگاهها در جهت رفع این موانع بوده است با این وجود هنوز نبود زمان کافی برای استفاده اصولی از فرآیند پرستاری، وقت‌گیر بودن و نبود فرم‌های مخصوص ثبت این فرآیند از بزرگ‌ترین موانع اجرای مناسب فرآیند پرستاری است.

لذا پیشنهاد می‌شود تا علاوه بر استمرار آموزش‌های لازم برای ایجاد انگیزه و دانش در پرستاران جهت به کارگیری فرآیند پرستاری از شیوه‌های فعل آموزشی از جمله سمینارها و کارگاه‌های عملی در محیط بیمارستان‌ها استفاده شود تا علاوه بر افزایش نگرش آن‌ها شکاف تئوری و عمل در فرآیند پرستاری کاهش یابد. همچنین با تقسیم وظایف و جبران کمبود پرسنل زمان بیشتری برای پرستاران فراهم شود تا بر بالین بیمار حضورداشته باشند و با توجه به ارتباط علاقه‌مندی به حرفة و نگرش مثبت‌تر، کیفیت فرایند تربیت و تعلیم پرستاران پس از ورود به رشته بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نمونه این مطالعه را پرستاران وابسته به دانشگاه تشکیل داده بود با توجه به اینکه دانش و نگرش فرآیند پرستاری در پرستاران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در مطالعات خارجی متفاوت گزارش شده است لذا مطالعه‌ای با همین عنوان در هر دو گروه از پرستاران انجام شود. همچنین با توجه به اینکه احتمالاً پرستاران شاغل مراکز درمانی تهران در بیش از یک مرکز کار می‌کنند این محدودیت نیز در نظر گرفته شود.

تشکر و قدردانی

لازم است تا بدین‌وسیله از زحمات تمام پرستارانی که در جهت انجام این پژوهش ما را یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را بنماییم.

پرستاران وابسته به مراکز دانشگاهی دانش بیشتری جهت اجرای فرآیند پرستاری دارند؛ و هرچه پرستاران دانش بالاتری از فرآیند پرستاری داشته باشد تمایل بیشتری به اجرای آن دارند (۱۱).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش سن و سابقه کار نگرش پرستاران نسبت به فرآیند پرستاری افزایش می‌یابد و از لحاظ آماری این افزایش معنادار است. این نتایج با مطالعه آب و همکاران (۲۰۱۴) که نشان داد پرستاران با سابقه کار بالاتر فرآیند پرستاری را بیشتر بکار می‌گیرند مشابه است (۱۱)؛ به نظر می‌رسد همان‌طور که سابقه کاری پرستاران افزایش می‌یابد پرستاران فرآیند پرستاری را در عمل می‌آزمایند و نگرش مثبت‌تری نسبت به آن پیدا می‌کنند.

نتایج این مطالعه نشان داد پرستارانی که بعد از ورود به رشته پرستاری به آن علاقه‌مند شده‌اند نگرش مثبت‌تری نسبت به فرآیند پرستاری دارند. میزان علاقه‌مندی پرستاران به رشته خود با مطالعه بروجنی و همکاران که نشان دادند بیشتر شرکت‌کنندگان از ماهیت رشته پرستاری رضایت دارند مشابه است (۱۸). رضایتمندی از ماهیت رشته پرستاری و مشارکت در کار تیمی جهت خدمت به بیماران باعث پذیرش بهتر استانداردها در امر مراقبت می‌شود و پرستاران علاقه‌مند به رشته پرستاری نگرش مثبت‌تری از فرآیند پرستاری به عنوان یک استاندارد مراقبتی خواهند داشت.

حاضر نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان نسبت به فرآیند پرستاری مثبت است و تمایل زیادی برای اجرای این فرآیند در امر مراقبت دارند. همچنین پرستارانی که دانش زیادی از مراحل و نحوه اجرای فرآیند پرستاری دارند فرآیند پرستاری را در امر مراقبت بیشتر بکار می‌گیرند. که این نشان از اصولی و مؤثر بودن آموزش‌های زمان تحصیل و بازآموزی‌های حین خدمت دانشگاه برای پرسنل است. کمبود دانش و

References

1. Tylor. Fundamental of Nursing the Art and Science of Nursing Care. Seventh edition. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins. 2011.
2. Miller-Keane. Encyclopedia & Dictionary of Medicine, Nursing & Allied Health. 2001;7th ed.
3. Lea SF, Anema MG, Briscoe VJ, Allie H. The nursing process: What do students know? *ABNF Journal*. 2001;12(1):3.
4. Aly, Salwa El-Badry, and Wafaa N. Ahmed Besely. "Utilization of Nursing Process in Clinical Practices: Nurses Knowledge and Barriers." *Journal of American Science* 2013; 9(12): 350-55.
5. Needleman, Jack. "Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals." *New England Journal of Medicine* 346.22 (2002): 1715-1722.
6. Pérez Rivas, Francisco Javier, et al. "Effectiveness of nursing process use in primary care." *International journal of nursing knowledge* 2016; 27(1): 43-48.
7. Kaji MA, Farahani BF. The effect of nursing process education on nursing care quality of schizophrenic patients Feyz, *Journal of Kashan University of Medical Sciences*. 2011;15(1):34-40. (Persian).
8. Huitzi-Egilegor JX, Elorza-Puyadena MI, Urkia-Etxabe JM, Zubero-Linaza J, Zupiria-Gorostidi X. Use of the nursing process at public and private centers in a health area. *Revista latino-americana de enfermagem*. 2012;20(5):903-8.
9. Ghafourifard M, Haririan H, Aghajanloo A, Akbari M, Shirvani Y. Obstacles of Nursing Process Application from Perspective of the Nursing Instructor and Nursing Students in Zanjan Faculty of Nursing and Midwifery. *J Med Edu*. 2012;5(8):69-77.
10. Mamseri, Redempta Alex. The nursing process as a means of improving patient care. 2012. PhD Thesis.
11. Abebe N, Abera H, Ayana M. The Implementation of Nursing Process and Associated Factors among Nurses Working in Debremarkos and Finoteselam Hospitals, Northwest Ethiopia, 2013. *J Nurs Care*. 2014;3(149):2167-1168.
12. Adeyemo FO, Olaogun AAAE. factors affecting the use of nursing process in health intitutions in ogbomoso town, oyo state. *International Journal of Medicine and Pharmaceutical Sciences*. 2013;3(1):89-96.
13. Atashzadeh F, Ashktorab T. Factors Influencing Implementation of Nursing Process by Nurses: A Qualitative Study. *Knowledge & Health*. 2011;6(3):16-23.
14. Bowman GS, Thompson DR, Sutton TW. Nurses' attitudes towards the nursing process. *Journal of advanced nursing*. 1983;8(2):125-9.
15. Hildman T, Ferguson G. Registered nurses' attitudes toward the nursing process and written/printed nursing care plans. *The Journal of nursing administration*. 1992;22(5):5.
16. Hagos F, Alemseged F, Balcha F, Berhe S, Aregay A. Application of Nursing Process and Its Affecting Factors among Nurses Working in Mekelle Zone Hospitals, Northern Ethiopia. *Nursing research and practice*. 2014; 15(7): 203-240.
17. Jansson I, Bahtsevani C, Pilhammar-Andersson E, Forsberg A. Factors and conditions that influence the implementation of standardized nursing care plans. *The Open Nursing Journal*. 2010; 4: 25.
18. Borujeni, A. Borjian, S. Reisi, and S. Borjian Borujeni. "The Survey of Satisfaction of Nursing Educated about their Field of Study, Borujen". *Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty*. 2010; 18(2): 50-60.

The study of the incidence of neural tube defects in hospitals of Kurdistan province in 1990

Amini O.M*, Ghiyoswandi Sh, Heme Khezri Y

Abstract

Introduction and Aim: Neural tube defects are among the common abnormalities of the central nervous system in neonates, which are often fatal and a global social medical problem. The aim of this study was to determine the incidence of neural tube defects in hospitals of Kurdistan province in the West of Iran.

Material and Methods: This prospective and descriptive study was conducted in all governmental hospitals of the province in the year 2011. All cases of neural tube defects that were born during the study were reviewed. Demographic, medical and obstetric information of the units was collected by a researcher-made questionnaire.

Results: In one year, 27153 cases of birth occurred in the province, of which 46 had neural tube defects. The incidence of defects was 1.68 in 1,000 births. The majority of mothers (60.9%) were between the ages of 25 and 16 years, with no history of the current disease (89.1%) and abortion (88%). The distribution of various defects was described.

Conclusion: According to the results of the study, the incidence of neural tube defects in Kurdistan province is less than previous studies in other regions of Iran. This decline seems to be due to improvements in prenatal care and social awareness raising and mothers awareness raising over the last decade.

Key words: Neural tube defects, incidence, birth defects

Omid Amini

MS in Nursing Student,
Tehran University of
Medical Sciences. Tehran,
Iran

*Correspondent Author

Ghiyasvandia Sh

Associate Professor School
of Nursing and Midwifery,
Tehran University of
Medical Sciences, Tehran,
Iran.

Hame khezri Y

MS in Nursing Student,
Tehran University of
Medical Sciences, Tehran,
Iran.